

Indikatorer og standarder for Dansk Hjertesvigtdatabase¹

Indikatorerne i Dansk Hjertesvigtdatabase er inddelt i to grupper. Den ene gruppe omhandler data indsamlet i den aktuelle opgørelsesperiode (incident hjertesvigt), og den anden gruppe omhandler data indsamlet i den forrige opgørelsesperiode (prævalent hjertesvigt).

Data vedrørende incident hjertesvigt

Indikatorområde	Indikator	Type	Standard
Ekkokardiografi	1. Andelen af patienter der tidligst 6 måneder inden og senest 7 hverdage efter indlæggelse/første ambulante kontakt får foretaget ekkokardiografi	Proces	≥ 90%
NYHA-klassifikation	2. Andelen af patienter der ved udskrivning/første ambulante kontakt eller indenfor de første 12 uger i deres sygdomsforløb NYHA-klassificeres	Proces	≥ 90%
Medicinsk behandling	3.a Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF≤ 40%) der er i, opstartes i/forsøges opstartet i behandling med ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist (ARB) senest 8 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt	Proces	≥ 90%
	3.b Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF≤ 40%) der er i, opstartes i/forsøges opstartet i behandling med betablokker senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt	Proces	≥ 80%
	3.c Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF≤ 35 %) der er i, opstartes i/forsøges opstartet i behandling med mineralocorticoid receptor-antagonist senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt	Proces	≥ 35%

Fysisk træning	4. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF ≤ 40%) der bliver henvist til individualiseret superviseret fysisk træning ved fysioterapeut i sygehusregi senest 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt eller bliver henvist til træning i kommunalt regi	Proces	≥ 35%
Struktureret undervisningsprogram	5. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF ≤ 40%) der under opfølgning i hjertesvigtklinik/under indlæggelse påbegynder et individualiseret undervisningsprogram som kan indeholde følgende temaer: ernæring, fysisk træning, symptom-, medicin- og sygdomsforståelse, risikofaktorer, indenfor 12 uger efter indlæggelse/første ambulante kontakt	Proces	≥ 80%
Genindlæggelser	6. Andelen af patienter der indlægges akut og uplanlagt inden for 4 uger efter udskrivning eller første ambulante kontakt, uanset årsag	Resultat	≤ 10%
Mortalitet	7a. Andelen af patienter, som dør inden for 1 år efter indlæggelse	Resultat	≤ 20%
	7b. Andelen af patienter, som dør inden for 1 år efter start af ambulante forløb	Resultat	≤ 10%

Data vedrørende prævalent hjertesvigt (udvalgt kohorte)²

Indikatorområde	Prævalent indikator	Type	Standard
Ekkokardiografi	1. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF ≤ 40%), der får fornyet/gentaget ekkokardiografi i perioden 30 dage til 1 år efter diagnostetidspunktet	Proces	≥ 70%

Medicinsk behandling	2a. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF \leq 40%), der stadig er i behandling med ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist 1 år efter diagnosetidspunktet	Proces	\geq 80%
	2b. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF \leq 40%), der stadig er i behandling med betablokker 1 år efter indlæggelse/første ambulante kontakt	Proces	\geq 80%
	2c. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF \leq 35%) der stadig er i behandling med mineralocorticoid antagonist 1 år efter indlæggelse/første ambulante kontakt	Proces	\geq 60%
Iskæmiudredning	3. Andelen af patienter med nedsat venstre ventrikelfunktion (LVEF) \leq 40%, der ikke har fået udført hjerte CT, myokardiescintigrafi eller KAG indenfor 1 år før første indlæggelse/påbegyndte ambulante forløb for hjertesvigt, der får udført en af disse undersøgelser i løbet af første år efter	Proces	$>$ 30%

1 Diagnose- og inklusionskriterier og datadefinitioner i relation til indikatorerne er beskrevet i "Datadefinitioner for Hjertesvigt-databasen", gældende fra 1/7-19

2 Disse data er baseret på den population, som indgik i forrige års opgørelse