

Beregningsregler for Dansk Testis Cancer Database (DaTeCadata)

Nr.	Indikator	Indikator	Nævner	Tæller
1	Komplet remission efter kemoterapi	Andel af patienter der opnår komplet remission efter kemoterapi	Patienter med et "Dissemineret" skema OG kode i LPR for kemoterapi (og A eller B diagnose for testiscancer, ved kontakten vedr. behandlingen) OG variabelen Prognose i "Dissemineret skema"=god	Patienter med komplet remission ifølge skemaet "Dissemineret" Indikatorudregningen gentages for hver af værdierne "intermediær" og "dårlig" af variabelen "Prognose" i skemaet "Dissemineret"
2	Kirurgisk-behandling	Andel af patienter der får foretaget sekundær kirurgi ved non-seminom og resttumor >1cm.	Patienter med non-seminom testicancer ifølge Patobank på et eller andet tidspunkt (M907* *6 ELLER M908**6 ELLER M91006 ELLER M907* *3 ELLER M908**3 ELLER M91003 på samme rekvisition) OG rest tumor >1 cm ifølge skema (oprettes som mulighed i indtastningsskemaet)	Operation for resttumor ifølge skemaet "Dissemineret"
3a	Recidivforekomst	Recidivforekomst indenfor 3 år hos stadium 1 non-seminom patienter fulgt med surveillance	Patienter med "Stadium 1" skema OG non-seminom tumor ifølge Patobank på et eller andet tidspunkt (M907* *6 ELLER M908**6 ELLER M91006 ELLER M907* *3 ELLER M908**3 ELLER M91003 på samme rekvisition)	Patienter med et "Recidiv skema"
3b		Recidivforekomst indenfor 3 år hos stadium 1 seminom patienter fulgt med surveillance	Patienter med "Stadium 1" skema OG seminom tumor ifølge Patobank (T78* OG M906*3)	
4		Antallet af recidiver efter behandling med kemoterapi for dissemineret sygdom	Patienter med et "Dissemineret" skema OG kode i LPR for kemoterapi (og A eller B diagnose for testiscancer, ved kontakten vedr. behandlingen)	



5	Overlevelse	Andel af patienter der lever 2 år efter behandling for testis cancer. (Tiden regnes fra dato for første kemoterapi)	Dissemineret skema OG kode i LPR for kemoterapi	Patienter med status forskellig fra 90 ifølge det centrale personregister. 2 år efter behandling
6	Patologi	Andel af rekvisitioner der får foretaget patologisk T kodning	Rekvisitioner vedr. patienter i studiepopulationen, med T78* OG M9***3 (OG P306x0)	Rekvisitioner med en ÆF18* kode for pT-stadium på rekvisitioner med T78 og M9***3 og P306x0
7		Andel af rekvisitioner der får foretaget patologisk kodning for karinvasion: "påvist" "ikke påvist"	Rekvisitioner vedr. patienter i studiepopulationen, med T78* OG M9***3 (OG P306x0)	Rekvisitioner med en M0942* kode for karinvasion
8		Andel af rekvisitioner der får anført snomedkode for tumorstørrelse	Rekvisitioner vedr. patienter i studiepopulationen, med T78* OG M9***3 (OG P306x0)	Rekvisitioner med en ÆTD*** kode for tumor diameter

