

## Indikatorer og standarder for Dansk Depressionsdatabase (Juni 2021: kun indikatorer vedr. indlæggelser opgøres, da populationen med ambulante forløb afventer tilpasning til LPR3)

Indikatorområde	Indikator	Type	Standard
<b>Udredning</b> 1. Vurdering ved speciallæge i psykiatri	<b>1a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , der vurderes ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdato	Proces	1a: ≥ 90 %
	<b>1b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg	Proces	1b: ≥ 90 %
2. Somatisk udredning	<b>2a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , hvor der er iværksat somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdato <b>2b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, hvor der er iværksat somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg	Proces Proces	2a: ≥ 90 % 2b: ≥ 60 %
<b>Sociale støttebehov</b>	<b>3a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse <b>3b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant forløb	Proces Proces	3a: ≥ 90 % 3b: ≥ 90 %
<b>Sværhedsgrad af depression</b> 4. Indlæggelsesstart	<b>4a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdato	Proces	4a: ≥ 95 %
	<b>4b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 30 dage efter 1. ambulante besøg	Proces	4b: ≥ 95 %
5. Udskrivning	<b>5a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse	Proces	5a: ≥ 95 %
	<b>5b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant forløb	Proces	5b: ≥ 95 %
<b>Selvmondsrisiko</b> 6. Indlæggelse	<b>6a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse	Proces	6a: ≥ 95 %
	<b>6b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, hvor patienten er undersøgt for selvmordsrisiko i forbindelse med 1. ambulante besøg	Proces	6b: ≥ 95 %
7. Udskrivning	<b>7:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , der er undersøgt for selvmordsrisiko ved udskrivelse	Proces	7: ≥ 95 %
<b>Psyko terapeutisk behandling</b>	<b>8:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg	Proces	8: ≥ 60 %
<b>Inddragelse af pårørende</b>	<b>9a:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , hvor der, senest ved udskrivning, er kommunikeret med pårørende med henblik på inddragelse <b>9b:</b> Andelen af <u>ambulante</u> patientforløb, hvor der, senest 90 dage efter 1. ambulante besøg, er kommunikeret med pårørende med henblik på inddragelse	Proces Proces	9a: 90 % 9b: 90 %
<b>Planlagt opfølgning</b>	<b>10:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , hvor der er planlagt opfølgning senest ved udskrivelse	Proces	10: ≥ 90 %
<b>Genindlæggelse</b>	<b>11_ex24:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> , hvor patienten genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse <b>11_ex48:</b> Andelen af <b>indlæggelser</b> af over 48 timers varighed, hvor patienten genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse	Resultat Resultat	Begge ≤15%
<b>Død i forbindelse med indlæggelse</b>	<b>12:</b> Andelen af <b>indlagte patienter</b> , der dør inden for 30 dage efter udskrivelse <b>12a:</b> Andelen af <b>indlagte patienter</b> , der dør under indlæggelse	Resultat Resultat	12-12a: Afventer