

Bilag 10. Indikatorskema NIP-kiropraktik: Standarder og indikatorer vedrørende patienter med lænderygproblemer i kiropraktorklinikker

| Indikatorområde | Nummer | Indikator | Type | Tidsreference | Standard |
|--|-----------|---|----------|---|----------|
| Anamnese | 1. | Andel af lænderygpatienter der får lavet sufficient anamnese (symptomudbredelse, varighed, tidligere episoder, registreret sygefravær, medicinforbrug, anden sygdom, smerteintensitet, røde flag) | Proces | Ved første besøg | ≥ 90 % |
| Objektiv undersøgelse for discogen smerte | 2. | Andel af lænderygpatienter med udstråling til ben hvor centralisering ved gentagne bevægelser er vurderet | Proces | Ved første besøg | ≥ 50 % |
| Neurologi | 3. | Andel af lænderygpatienter med udstråling til ben der får lavet sufficient neurologisk undersøgelse (SBT inkl. krydset SBT, omvendt SBT, testet muskelkraft, sensibilitet og reflekser) | Proces | Ved første besøg | ≥ 90 % |
| Billeddiagnostik | 4. | <ul style="list-style-type: none"> a. Andel af lænderygpatienter som kiropraktoren har udredt billeddiagnostisk, hvor der er indikation i henhold til gældende retningslinjer. b. Andel af lænderygpatienter som ikke er blevet udredt billeddiagnostisk, hvor der ingen indikation er i henhold til gældende retningslinjer. | Proces | I behandlingsforløbet | ≥ 80 % |
| Klassifikation | 5. | Andel af lænderygpatienter hvor Quebec klassifikation registreres | Proces | I behandlingsforløbet | ≥ 90 % |
| Øvelsesterapi | 6. | Andel af subakutte og kroniske lænderygpatienter (varighed af aktuelle LRP > 6 uger) der instrueres i rygøvelser | Proces | I behandlingsforløbet | ≥ 90 % |
| Selvrapporteret effektmål | 7. | Andel af lænderygpatienter der får målt selvrapporteret effekt ved global rating | Proces | Mellem 4. og 5. behandling eller senest 1 måned efter første konsultation | ≥ 95 % |
| | 8. | Andel af lænderygpatienter der angiver relevant forbedring ("Meget bedre" eller "Bedre") ved selvrapporteret global rating | Resultat | Mellem 4. og 5. behandling eller senest 1 måned efter første konsultation | ≥ 50 % |
| Revurdering | 9. | Andel af lænderygpatienter som ikke angiver relevant forbedring ("Meget bedre" eller "Bedre") ved selvrapporteret global rating efter 4. behandling eller senest en måned efter første konsultation, der får revurderet deres behandlingsplan | Proces | Ved 5. besøg eller senest en måned efter første konsultation | ≥ 90 % |